

Pangshura smithii

DISTRIBUZIONE

Nord dell'India, Nepal, Pakistan sud-orientale e Myanmar.

HABITAT

Corsi d'acqua lenti e ampie raccolte d'acqua con vegetazione acquatica e fondali fangosi.

DIMENSIONI MASSIME

Medie; 15-23 cm. Alcune femmine arrivano anche a 25 cm.

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI(abitudini)

Tartaruga acquatica con ottime capacità di nuoto. Trascorre molte ore al giorno su tronchi, rocce e altri appigli. Ha abitudini prevalentemente giornaliere. Di indole particolarmente schiva, con il passare degli anni, in cattività diventa più tranquilla anche non esita a nascondersi e scappare ad ogni minimo pericolo.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

Sono tartarughe che riescono ad adattarsi bene alla vita in cattività, anche se bisogna ridurre al minimo i fattori di stress. Durante il periodo estivo può essere allevata all'aperto in un laghetto profondo almeno 1 metro con circa 20 cm di fondo melmoso, tronchi che emergono dall'acqua, appigli, molte piante acquatiche e un'ampia zona con torba, terriccio e foglie secche per la deposizione. Per evitare eventuali fughe è bene che il laghetto sia recintato in quanto l'introduzione di specie alloctone in natura provoca la scomparsa di molte specie autoctone. In acquaterrario per il periodo che va da ottobre ad aprile. Acqua alta fino a 25cm, soprattutto per esemplari adulti, con appigli e piante acquatiche. Temperature dell'acqua tra i 23 e i 25°C. Area basking formata da rocce o pezzi di sughero e uno spot che mantenga la temperatura di questa zona sui 30°. Infine un neon UVB posto a massimo 30 cm dal livello dell'acqua.

ALIMENTAZIONE

E' una specie onnivora. Può essere somministrato pesce d'acqua dolce (alborelle, acquadelle, trota ecc.), insetti (grilli, cavallette, camole della farina...), girini, lombrichi e piccole chioccioline con guscio. Poi ampia varietà di vegetali e di piante acquatiche, sin dai primi anni. Si consiglia di somministrare con parsimonia carne e pellet. E' consigliato somministrare vitamine e calcio e di lasciare a disposizione un osso di seppia per fornire il calcio necessario. E' necessario che la dieta sia estremamente varia per non incorrere a carenze di qualsiasi tipo.

RIPRODUZIONE

Specie molto prolifica, effettua più deposizioni (in genere due o tre) nell'arco della stagione. Le uova a seconda della temperatura impiegano dai 2 ai 3 mesi per schiudersi a temperature tra i 25 e i 32°C.

LETARGO

No alle nostre temperature: si consiglia un periodo di brumazione di alcune settimane.

STATUS GIURIDICO

È inserita in CITES, appendice II.

