

Pelusios castanoides castanoides

Distribuzione

Africa sud-orientale; Malawi, Mozambico, Sud Africa nord-orientale, Madagascar.

Habitat

Acque poco profonde di paludi e stagni fangosi, con discreta presenza di vegetazione acquatica.

Dimensioni massime

Medie. Le dimensioni del carapace possono raggiungere un massimo di 23 cm.

Caratteristiche comportamentali

Specie acquatica, non particolarmente abile nel nuoto. Trascorre molto tempo nascosta tra la vegetazione acquatica per riposare e rimanere in agguato in attesa del passaggio di una preda. In caso di prosciugamento degli ambienti acquatici può estivare per un lungo periodo.

Mantenimento in cattività

Questa specie alle nostre latitudini può essere allevata all'aperto, in laghetto, solo durante la stagione calda. Il laghetto deve essere abbastanza grande e poco profondo, provvisto di appigli, ripari e vegetazione acquatica. Per l'allevamento in acquaterrario è necessario che anch'esso sia abbastanza grande e non molto profondo, dotato di una zona terrestre, appigli, ripari, vegetazione acquatica, filtro e lampada UV-A/UV-B. L'acqua va riscaldata ad una temperatura tra 25 e 28°C.

Alimentazione

Specie carnivora, può essere somministrato pesce d'acqua dolce (acquadelle, trota, alborelle ecc.), insetti (grilli, lombrichi, camole), girini, piccoli crostacei, molluschi e piante acquatiche; con molta parsimonia carni rosse e bianche, occasionalmente cibi in pellet. E' buona norma lasciare a disposizione un osso di seppia per fornire il calcio necessario. E' importante che la dieta sia molto varia in modo da evitare carenze di qualsiasi tipo.

Riproduzione

Insufficienti i dati sulla riproduzione. Possono deporre fino a 15-20 uova.

Letargo

No. Non deve osservare un periodo di letargo.

Status giuridico

Non è inserita in CITES, quindi è di libera vendita. Non è considerata specie a rischio.

