

Podocnemys unifilis o cajennensis

DISTRIBUZIONE

Sud America: nei bacini caraibici delle Guayane, in Venezuela, Colombia, negli alti tributari del Rio delle Amazzoni in Ecuador, Perù, nord della Bolivia, sud del Venezuela e Brasile.

HABITAT

Laghi, stagni, piccoli bacini e anse lungo le rive dei fiumi di maggiori dimensioni.

DIMENSIONI MASSIME

Il carapace può avere un lunghezza che varia tra 35 e 68 cm.

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

Specie prevalentemente acquatica, ama particolarmente trascorrere gran parte della giornata su tronchi emersi o lungo le rive, facendo basking. I piccoli, più timidi, escono dall'acqua con meno frequenza.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

Durante i mesi più caldi è consigliato l'allevamento in grandi laghetti, con una buona zona emersa dove la tartaruga può uscire per esporsi al sole. In inverno o quando le temperature sono troppo basse deve essere alloggiata all'interno, in un acquaterrario molto ampio, viste le dimensioni raggiunte da questa tartaruga, e suddiviso in una parte acquatica per 4/5 e una parte emersa per 1/5 restante della superficie. La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra i 25° e i 30°C. Il fondo può essere costituito da sabbia o ghiaia mentre sulla parte emersa devono essere montati un neon uva-uvb specifico per rettili e uno spot per ricreare un'area di maggior calore, sui 32° C, particolarmente sfruttata da questa tartaruga.

ALIMENTAZIONE

Prevalentemente vegetariana da adulta, i piccoli sono praticamente onnivori. Possono essere alimentati con pellets specifici per tartarughe, molti tipi di pesci d'acqua dolce (tra cui acquadelle e trota), girini, pezzetti di carne di pollo e cuore e fegato di bue, lombrichi, lumachine d'acqua dolce e saltuariamente camole del miele. La dieta base deve essere però costituita comunque da vegetali, lattuga di tutti i tipi, radicchio, pezzi di frutta ben matura.

RIPRODUZIONE

Il periodo riproduttivo può variare in base all'area di distribuzione di questa tartaruga. La deposizione può avvenire in un'ampia varietà di substrati e anche a notevole distanza dall'acqua. Probabilmente si hanno almeno 2 deposizioni a stagione di circa 15-25 uova.

Con una temperatura d'incubazione di 28° C circa ed un'umidità del 90-100% le uova possono richiedere 60-80 giorni per la schiusa.

LETARGO

Non affronta il periodo di letargo.

STATUS GIURIDICO

E' inserita nell'Appendice II del CITES e in Allegato B del Reg. CE. Per molti anni è stata minacciata a causa dello sfruttamento delle carni e delle uova per uso alimentare dalle popolazioni locali.

