

Pseudemydura umbrina

Distribuzione

Occupano una ristretta area dell'Australia sud-occidentale.

Habitat

Corsi d'acqua poco profondi, come paludi, ruscelli e raccolte d'acqua temporanee.

Dimensioni massime

Piccole. Il carapace può misurare al massimo 15,5 cm. I maschi sono più grandi delle femmine.

Caratteristiche comportamentali

Specie strettamente acquatica, non troppo incline al nuoto, di indole timida e non aggressiva. Durante la stagione calda e secca estiva per un lungo periodo. Particolarità di questa specie è che la femmina quando depone, diversamente dalle altre tartarughe, scava una buca utilizzando le zampe anteriori.

Mantenimento in cattività

All'aperto è necessario un laghetto poco profondo ed esposto in una zona non molto calda. Per l'allevamento in acquaterrario è necessario che esso sia, abbastanza grande e non molto profondo, fornito di una zona terrestre, ripari, appigli, lampada UV-A/UV-B e un buon filtro che mantenga una buona qualità dell'acqua. L'acqua va riscaldata ad una temperatura tra 18 e 24°C.

Alimentazione

Specie carnivora. In natura si nutre principalmente di insetti, ma anche crostacei e piccoli anfibi.

Riproduzione

La maturità sessuale è raggiunta tardi, attorno ai 10 anni. Le femmine depongono dalle 2 alle 5 uova. Le uova schiudono dopo un lungo periodo di incubazione, ovvero 6 mesi circa. Per il corretto sviluppo dell'embrione è necessario un periodo di diapausa.

Letargo

No. Considerando le zone di origine non deve osservare un periodo di letargo.

Status giuridico

Questa specie è ad alto rischio di estinzione. È inserita in CITES, Appendice I, Allegato A.

