

# *Staurotypus triporcatus*

## DISTRIBUZIONE

America centrale: Messico, Belize, Guatemala, Honduras.

## HABITAT

Vive nei laghi, negli acquitrini, nelle lagune dei grandi fiumi e nei corsi d'acqua con una lenta corrente e ricchi di vegetazione. Alcune volte si rinviene in acque salmastre lungo la costa.

## DIMENSIONI MASSIME

Il carapace può raggiungere una lunghezza massima di 37-38 cm circa.

## CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

Questa tartaruga ha un'indole particolarmente aggressiva e può infliggere dei morsi abbastanza pericolosi, anche in virtù delle dimensioni. Per questo è necessario fare molta attenzione. È aggressiva anche con esemplari della stessa specie.

## MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

Nei mesi caldi è possibile allevarla in laghetti all'aperto, con una zona emersa. Durante l'inverno invece è necessario allestire un grande acquaterrario all'interno con una parte acquatica ben più grande di quella emersa. La temperatura dell'acqua deve aggirarsi intorno ai 25-28° C. Il fondo può essere costituito da sabbia o ghiaia, mentre nella zona emersa si può usare sabbia o terriccio mantenuto abbastanza umido. Su questa zona deve essere presente inoltre un neon uva-uvb, specifico per tartarughe, per assicurare un minimo apporto di raggi uva-uvb.

## ALIMENTAZIONE

Predatrice particolarmente vorace, questa tartaruga ha un'alimentazione prevalentemente carnivora. Può essere alimentata con pellets per tartarughe acquatiche, lumache terrestri e d'acqua dolce, lombrichi, gamberi freschi, molti tipi di pesce (tra cui acquadelle, pezzetti di trota e di alici, quest'ultime con parsimonia), girini, pezzetti di pollo e cuore e fegato di bue. Saltuariamente si possono offrire camole del miele e pinkies decongelati. La dieta, oltre ad essere più varia possibile, deve essere molto controllata, considerando che questa specie, come altri Kinosternon, tende a soffrire l'obesità.

## RIPRODUZIONE

La deposizione può contare generalmente da 3 a 6 uova e ha luogo tra settembre e ottobre. In cattività si possono avere più deposizioni durante l'anno. L'incubazione, con particolari accorgimenti, può durare dai 3 ai 4 mesi.

## LETARGO

Non affronta il periodo di letargo

## STATUS GIURIDICO

Non è una specie protetta, per cui è di libera vendita.

