

Chelodina novaguineae

DISTRIBUZIONE

Nuova Guinea: distribuita nelle isole e nella fascia costiera di Papua.

HABITAT

Fiumi e laghi, specialmente quelli distribuiti lungo le coste.

DIMENSIONI MASSIME

Può raggiungere i 30 cm massimo di carapace. Generalmente la lunghezza media è di poco inferiore.

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

Non si dimostra aggressiva se non quando è infastidita e non particolarmente mordace come potrebbe far pensare il suo nome comune: "tartaruga azzannatrice della Nuova Guinea".

Ha costumi prevalentemente acquatici ed è un'ottima nuotatrice, per questo è necessario che abbia spazio a disposizione per nuotare.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

Nei mesi più caldi è consigliato l'allevamento in grandi laghetti all'aperto, con una zona emersa che permette all'animale di uscire ed esporsi al sole. Durante l'inverno invece è necessario allestire un acquaterrario, con parte acquatica per $\frac{3}{4}$ della superficie e la parte emersa per $\frac{1}{4}$ restante. La temperatura deve essere compresa tra i 24° e i 28 °C circa. La parte emersa deve essere fornita di uno neon uva-uvb specifico per tartarughe.

ALIMENTAZIONE

È una specie prevalentemente carnivora. Può essere alimentata con pellets per tartarughe acquatiche, molti tipi di pesce (tra cui acquadelle, trota, alici saltuariamente), gamberi freschi, pezzetti di carne di pollo, di cuore e fegato di bue, girini, lombrichi. È molto importante, come per qualsiasi altra tartaruga, variare la dieta più possibile.

RIPRODUZIONE

Generalmente si ha una sola deposizione durante l'anno, in un periodo che può andare da ottobre a dicembre. Le uova, che possono essere 10-20 per deposizione, impiegano circa 120-180 giorni per schiudersi.

LETARGO

Non affronta il periodo di letargo.

STATUS GIURIDICO

È una specie di libera vendita e non figura come protetta o considerata a rischio dello IUCN.

