

# *Geochelone carbonaria*

## **DISTRIBUZIONE**

Da Panama, in tutta l'Amazzonia e più a sud fino al nord dell'Argentina.  
Sono state introdotte anche in qualche isola Caraibica

## **HABITAT**

Vive negli ambienti umidi delle foreste e anche delle pianure.

## **DIMENSIONI MASSIME**

Quasi 40 cm nei maschi, 30,35 nelle femmine.

## **CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI(abitudini)**

Sono di carattere molto timide, di solito si alimentano di prima mattina o al crepuscolo; in cattività però si abituano alla presenza dell'uomo.

## **MANTENIMENTO IN CATTIVITA'**

In cattività devono sempre disporre di acqua per bere, per immergersi e possibilmente una zona con substrato umido l'umidità deve essere molto elevata (80/90%) e la temperatura di 25-30°C diurna e può scendere anche fino a 15 di notte se adulte, mentre per esemplari piccoli non scendere sotto i 20°C. Ovviamente in cattività necessitano di una zona con lampada spot con calore elevato(35-40°C) e lampade per un corretto apporto di raggi UVB che gli permette di assimilare la pro-vitamina D3. Però quando la temperatura esterna non scende più sotto i 15°C , è opportuno trasferirle nei recinti esterni facendo attenzione all'umidità che sia sempre elevata.

## **ALIMENTAZIONE**

Sono onnivore con discreta percentuale di frutta matura che cade dagli alberi.  
Si cibano spesso di carcasse di animali morti, da cui ricavano gran parte della vitamina D3 che necessita; si nutrono anche di lumache, formiche, termiti, api, scarabei, farfalle, sabbia, terreno e cortecce(per ricavare i minerali).  
In cattività, occorre quindi alimentarle con frutta matura e mix di verdure possibilmente selvatiche, sempre consigliabile fornirle qualche pezzo di osso di seppia e un po' di vitamine più sali minerali. Ogni 10-15 giorni è consigliabile dare anche un po' di proteine, possibilmente lombrichi o lumache o in alternativa crocchette per cani a basso contenuto di grassi.  
Come alimentazione è simile alle *Geochelone denticulata* e molto simile anche al genere *Kinixis*.

## **RIPRODUZIONE**

Solitamente l'accoppiamento avviene nei periodi di pausa tra i cicli di deposizione(in natura specialmente dopo le piogge che il maschio viene attratto dai colori più brillanti della femmina); la corteggia più insistentemente con un rituale che inizia annusandole la zona della coda, poi si pone davanti e la testa esegue dei movimenti verso l'alto e di lato, dopo di che inizia ad accoppiarsi.  
La femmina depone in media da 5 a 20 uova in più deposizioni(solitamente 4-5) ad intervalli regolari di 30 giorni.  
In incubatrice , le uova vanno incubate per circa 120 giorni a 30-32°C ed umidità di 80-90%.

## **LETARGO**

Non effettua letargo, quindi nella stagione fredda, deve essere allevata in terrario.

## **STATUS GIURIDICO**

E' compresa nella Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) in Appendice 2, allegato B.

