Amyda cartilaginea

DISTRIBUZIONE

Asia: Golfo del Tonchino in Vietnam, Laos, Cambogia, Tailandia, fino alla Malesia, Java, Sumatra e Borneo.

HABITAT

Fiumi montani o di pianura a corso lento, laghi e stagni caratterizzati da fondale fangoso o sabbioso.

DIMENSIONI MASSIME

Può raggiungere 70-83 cm di carapace, ma in cattività le dimensioni medie sono inferiori.

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

Specie prevalentemente acquatica, raramente fa basking o esce fuori dall'acqua, trascorrendo gran parte del tempo seppellita sotto la sabbia del fondo, in acqua. Sembra che abbia abitudini particolarmente crepuscolari e notturne.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

Può essere allevata in un laghetto all'aperto durante i mesi più caldi. Durante l'inverno deve essere allestito un ampio acquaterrario dotato di un buon filtro biologico (dato che questa tartaruga, come le altre a guscio molle, è particolarmente sensibile ad infezioni della pelle), diviso in parte acquatica per ¾ e parte emersa per 1/4, utilizzata prevalentemente dalla femmina per la deposizione. Il livello dell'acqua deve essere abbastanza alto, considerate le dimensioni degli esemplari, e il fondo dell'acquaterrario costituito da uno strato di sabbia in cui l'animale può scavare e nascondersi.

La temperatura dell'acqua deve aggirarsi tra i 22°-26° C.

ALIMENTAZIONE

Specie carnivora, può essere alimentata con una grande varietà di pesci d'acqua dolce (tra cui acquadelle e trota), con lombrichi, gamberi, anfibi , pezzetti di carne di pollo o fegato e cuore di bue e saltuariamente camole del miele.

RIPRODUZIONE

Le uova vengono deposte i banchi di fango. Si possono avere 3 o 4 deposizioni l'anno con un numero di uova che può variare da 6 a 10 per covata per le femmine giovani, fino a 20-30 per le femmine più vecchie.

LETARGO

Non effettua un periodo di letargo.

STATUS GIURIDICO

E' inserita in Appendice II del CITES e in allegato B del Reg. CE.

