

Geochelone yniphora

DISTRIBUZIONE

Allo stato selvatico si trova unicamente in alcune foreste del nord del Madagascar, con sparse popolazioni isolate tra loro a causa del disboscamento del loro habitat.

HABITAT

Vive in zone abbastanza aride, tipo savana, spingendosi anche all'interno di boscaglie spinose e di bambù e non disdegnando zone più umide.

DIMENSIONI MASSIME

Anche 45 cm nei maschi, per un peso di oltre 15 kg. Più piccole le femmine.

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI(abitudini)

Il comportamento è aggressivo e territoriale nei confronti dei propri simili, soprattutto tra i maschi. Per il resto si tratta di una specie docile e tranquilla, attiva durante le ore del giorno, alimentandosi di preferenza durante il primo mattino e il tardo pomeriggio. Mostra una ridotta attività durante la stagione più fredda e secca, che nel Madagascar nord- occidentale corrisponde al periodo che va da Maggio a Ottobre.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

Simile a quello di *G.radiata*. In terrario fornire un habitat di tipo "asciutto". È importante fornire una buona esposizione ai raggi UV durante il soggiorno in terrario, mediante l'uso di lampade specifiche per rettili. La temperatura deve variare da circa 30 gradi nella zona più calda a circa 24-26 nella zona fresca. La temperatura notturna può abbassarsi fino a 20-21 gradi. Terrario di buone dimensioni, almeno 200x100 cm per esemplare, vista anche la territorialità dei maschi. Ricordiamo di allevare un solo maschio per terrario, magari associato a più femmine. Non deve mancare un basso recipiente per l'acqua, che deve essere sempre pulita. Allevamento all'aperto consigliabile durante il periodo estivo, in un recinto che riservi la maggior quantità di sole durante la giornata. Il recinto deve essere spazioso, senza molta vegetazione. L'ideale è un cespuglio per fornire ombra e riparo, più una casetta per rintanarsi alla notte o se il sole scalda eccessivamente. Molto gradite saranno le erbe selvatiche che cresceranno nel recinto.

ALIMENTAZIONE

L'alimentazione è erbivora. Evitare alimenti di origine animale. La frutta va data solo occasionalmente. La base alimentare sarà costituita da verdure, quali tutti i tipi di radicchio e cicoria, erbe selvatiche come il trifoglio e il tarassaco ecc. Importante l'aggiunta di calcio e multi vitaminico per rettili una volta ogni 20 giorni.

RIPRODUZIONE

La riproduzione è stata una delle difficoltà maggiori anche per i centri di recupero in Madagascar. La maturità sessuale è raggiunta intorno ai 20 anni in natura, qualche anno prima in cattività, esiste poi un periodo preferito per gli accoppiamenti, in genere alla fine della stagione fresca e piovosa. Inoltre i maschi sono stimolati all'accoppiamento se hanno modo di lottare con altri maschi. I maschi si accoppiano con quante più femmine riescano a incontrare. La femmina, può deporre da 3 a 6 uova per ogni deposizione, a intervalli di un mese e mezzo circa una dall'altra, per un totale di 4-6 deposizioni. Le uova presentano di solito una bassa fertilità, di solito non superiore al 50%. La durata dell'incubazione a 30 gradi varia da 150 a 200 giorni, in natura anche 300 giorni. I piccoli vanno allevati con le stesse modalità degli adulti.

LETARGO

Non effettuato, effettua una riduzione dell'attività durante la stagione secca e più fresca in natura.

STATUS GIURIDICO

È compresa nella Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) in Appendice I.