

Kinosternon leucostomum leucostomum

DISTRIBUZIONE

Dalla provincia messicana di Veracruz centrale sino al Nicaragua, attraverso il versante atlantico del Messico meridionale, Belize e Guatemala.

HABITAT

Frequenta acque calme poco profonde con fondo melmoso e abbondante vegetazione nelle foreste di pianura: paludi, acquitrini, piccoli corsi d'acqua, lagune e stagni. E' stata avvistata anche in acque salmastre. La sua attività si sviluppa in genere in una fascia di territorio larga da 50 a 200 metri, parallela ai corsi d'acqua.

DIMENSIONI

I maschi arrivano a 17,5 cm., le femmine a 15,8 cm.. La sottospecie tipica presenta il carapace piuttosto convesso e il piastrone grande.

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

Ha abitudini prettamente notturne. Durante il giorno se ne sta rintanata in acque basse tra la vegetazione più fitta, facendo uscire solo la parte superiore del muso. Pur passando la più parte della sua esistenza in acqua, *Kinosternon leucostomum* può estivare (la cosiddetta diapausa dovuta a periodi particolarmente siccitosi) interrandosi anche a notevole distanza dai corsi d'acqua.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

Specie di non difficile allevamento, va tenuta all'esterno in vasche con acqua poco profonda e ricche di vegetazione soltanto nei mesi più caldi avendo cura di alloggiarla all'interno almeno da Ottobre ad Aprile. In questo periodo non ha bisogno di usufruire di illuminazione diretta, ma solo di una discreta fonte di riscaldamento. Sarà opportuno un periodo di "brumazione" a 12-15°C per stimolare l'istinto riproduttivo nella successiva stagione primaverile.

ALIMENTAZIONE

Specie onnivora si nutre, esclusivamente in acqua, di una grande varietà di alimenti, sia di origine vegetale (frutta, semi, germogli, foglie) che animale, insetti acquatici, aracnidi, crostacei, chioccioline, bruchi, pesci, anfibi (soprattutto girini), rettili, piccoli mammiferi e carogne.

RIPRODUZIONE

Le deposizioni avvengono durante le ore notturne, probabilmente lungo l'intero arco dell'anno, con due picchi riproduttivi, collocati uno all'inizio della stagione delle piogge (da fine Agosto alla prima metà di Settembre), l'altro all'inizio della stagione secca (da metà Febbraio a metà Marzo). Le uova in numero da 1 a 3 (in genere una sola volta l'anno) sono deposte in buche poco profonde o lasciate in superficie e appena coperte con foglie e detriti. In natura schiudono in 126-148 giorni.

LETARGO

Non va mandata in letargo.

STATUS GIURIDICO

Attualmente di libera vendita.

