

Kinosternon subrubrum

DISTRIBUZIONE

Dal Connecticut e Long Island fino a sud lungo la costa del Golfo, ad ovest fino al Texas centro-orientale, in Missouri, sud Illinois e sud Indiana

HABITAT

Corsi acquatici lenti, piccoli laghi, raccolte d' acqua con vegetazione acquatica e fondali fangosi poco profondi.

DIMENSIONI MASSIME

Piccole; 13 cm e mezzo. Difficilmente superano i 10 cm di lunghezza.

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI(abitudini)

Poco propensa al nuoto, preferisce sostare in acque poco profonde. Ha abitudini strettamente notturne e crepuscolari. Mal sopporta le temperature estive troppo elevate per cui e' molto frequente l' estivazione. Carattere mite e schivo.

MANTENIMENTO IN CATTIVITA'

Sono tartarughe che riescono ad adattarsi molto bene ai nostri climi e se correttamente stabulate è possibile allevarle all' aperto tutto l' anno in un laghetto profondo almeno 1 metro con circa 30 cm di fondo fangoso o sabbioso con argini non troppo ripidi, tronchi che emergono dall' acqua, molte radici, appigli e un' ampia zona di battigia molto bassa. Piante acquatiche per ricreare un ambiente ottimale. Deve essere costruito in una zona soleggiata ma con zone d' ombra. Per evitare eventuali fughe è bene che sia recintato per almeno 50 cm o più in altezza e ulteriori 30 cm sotto terra.

In acquaterrario fino alla taglia di 10 cm. Acqua alta quanto la lunghezza dell' animale, con appigli o delle zone di sosta meno profonde. Temperature dell' acqua intorno i 23°C. Area emersa costituita da sassi non taglienti o tronchi e una superficie estesa pari almeno al 30% della superficie acquatica, dotata di un neon UVB posto a massimo 30 cm senza nulla interposto.

ALIMENTAZIONE

E' una specie carnivora. Può essere somministrato pesce d' acqua dolce (alborelle, acquadelle, trota ecc..), insetti (grilli, cavallette, camole della farina...), girini e piccoli invertebrati: i cibi più graditi e adatti a questa specie sono lombrichi e piccole chioccioline con guscio. Solo raramente si cibano di piante acquatiche galleggianti. Si consiglia di somministrare con parsimonia carni bianche e rosse. Ogni tanto possono essere somministrati cibi in pellet di ottima marca ma senza abusarne. E' buona norma lasciare sempre a disposizione un osso di seppia per fornire il calcio necessario. E' necessario che la dieta sia estremamente varia per non incorrere a carenze di qualsiasi tipo.

RIPRODUZIONE

La maturazione sessuale viene raggiunta tardi, dopo il 7° anno di eta. Depongono circa 4 o 5 uova (fino a 10) in più deposizioni (in genere due o tre) nell' arco della stagione. Le uova a seconda della temperatura impiegano dai 3 ai 4 mesi per schiudersi a temperature tra i 25 e i 32°C ed elevata umidità.

LETARGO

Si alle nostre temperature: dai primi di novembre a metà marzo, nel fondale fangoso. Sconsigliato ai giovani esemplari e a quelli debilitati o in via di guarigione.

STATUS GIURIDICO

Kinosternon subrubrum non è in nessuna legge o decreto ministeriale. Non è considerata specie a rischio.

